

Eksamen

23.11.2018

REA3024 Matematikk R2



## Bokmål

Eksamensinformasjon	
<b>Eksamenstid</b>	5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 3 timer. Del 2 skal leveres inn etter 5 timer.
<b>Hjelpemidler på del 1:</b>	Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.
<b>Hjelpemidler på del 2:</b>	Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.
<b>Framgangsmåte:</b>	Del 1 har 8 oppgaver. Del 2 har 4 oppgaver.  Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Dersom oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, kan en alternativ metode gi lav/noe uttelling.  Bruk av digitale verktøy som graftegner og CAS skal dokumenteres.
<b>Veiledning om vurderingen:</b>	Poeng i Del 1 og Del 2 er bare veiledende i vurderingen. Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad du <ul style="list-style-type: none"><li>– viser regneferdigheter og matematisk forståelse</li><li>– gjennomfører logiske resonnementer</li><li>– ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner</li><li>– kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler</li><li>– forklarer framgangsmåter og begrunner svar</li><li>– skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger</li><li>– vurderer om svar er rimelige</li></ul>
<b>Andre opplysninger:</b>	Kilder for bilder, tegninger osv.: <ul style="list-style-type: none"><li>– Alle grafer og figurer: Utdanningsdirektoratet</li></ul>

## DEL 1 Uten hjelpemidler

### Oppgave 1 (3 poeng)

Deriver funksjonene

a)  $f(x) = 6 \cos(2x - 1)$

b)  $g(x) = \cos^2 x + \sin^2 x$

### Oppgave 2 (5 poeng)

Bestem integralene

a)  $\int (2x^2 - 3x) dx$

b)  $\int 4x \cdot \cos(x^2 + 2) dx$

c)  $\int \frac{4}{x^2 - 4} dx$

### Oppgave 3 (4 poeng)

En geometrisk rekke er gitt ved

$$S(x) = 1 + e^{-x} + e^{-2x} + e^{-3x} + \dots$$

- For hvilke verdier av  $x$  konvergerer denne rekken?
- Bestem  $x$  slik at rekken konvergerer mot 3.

## Oppgave 4 (6 poeng)


Funksjonene  $f$  og  $g$  er gitt ved

$$f(x) = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$g(x) = \cos x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

- Lag en skisse av grafene til  $f$  og  $g$  i samme koordinatsystem.
- Bestem eventuelle skjæringspunkt mellom grafene til  $f$  og  $g$ .  
Grafene til  $f$  og  $g$  avgrenser et område.
- Bestem arealet av dette området.

## Oppgave 5 (4 poeng)



Bøyen sett ved tre ulike tidspunkt

En bølge beveger seg opp og ned med bølgene. I løpet av 4 s vil bøyen bevege seg 2,4 m i vertikal retning fra det høyeste punktet til det laveste punktet.

La  $f(t)$  være høyden til bøyen (i meter) over likevektslinjen ved tidspunktet  $t$  (målt i sekunder). Anta at bøyen er på sitt høyeste punkt når  $t = 0$ .

Vi går ut fra at  $f(t)$  kan skrives på formen

$$f(t) = A \sin(ct + \varphi)$$

- Bestem funksjonsuttrykket til  $f$ .
- Når er bøyen 0,6 m over likevektslinjen i løpet av de 10 første sekundene?

### Oppgave 6 (4 poeng)


Retningsdiagrammet på figuren tilhører én av differensiallikningene nedenfor.

1)  $y' = x + y$

2)  $y' = \frac{x}{y}$

3)  $y' = x \cdot y$

- a) Avgjør hvilke to av de tre differensiallikningene som ikke kan ha et slikt retningsdiagram.
- b) Løs differensiallikningen du mener retningsdiagrammet tilhører.



### Oppgave 7 (7 poeng)

Gitt punktene  $A(-1,1,1)$ ,  $B(1,-1,0)$  og  $C(-1,0,2)$

- a) Bestem  $\overline{AB}$  og  $\overline{AC}$ .
- b) Vis at  $A$ ,  $B$  og  $C$  ligger i planet gitt ved

$$3x + 2y + 2z - 1 = 0$$

Gitt punktet  $D(s^2 - 1, 3s + 1, 10)$ , der  $s$  er et reelt tall.

- c) Bestem volumet av tetraederet  $ABCD$  uttrykt ved  $s$ .
- d) Bestem det minste volumet tetraederet kan ha.

### Oppgave 8 (3 poeng)

Bruk induksjon til å bevise at påstanden  $P(n)$  er sann for alle  $n \in \mathbb{N}$

$$P(n): 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

## DEL 2 Med hjelpemidler

### Oppgave 1 (5 poeng)

Funksjonene  $f$  og  $g$  er gitt ved

$$f(x) = x^4 - 4x - 1$$

$$g(x) = 4x^3 - 6x^2 - 1$$

a) Tegn grafene til  $f$  og  $g$  i et koordinatsystem.

De to grafene avgrensar et område  $M$  i planet.

b) Bestem arealet av  $M$ .

Funksjonene  $F$  og  $G$  er gitt ved

$$F(x) = x^4 - 4r^3 \cdot x - 1$$

$$G(x) = 4r \cdot x^3 - 6r^2 \cdot x^2 - r^4$$

Grafene til  $F$  og  $G$  avgrensar et område  $N$  i planet.

c) Bruk CAS til å vise at arealet av  $N$  er uavhengig av  $r$ .

### Oppgave 2 (7 poeng)

Sentrum i en kuleflate  $K_1$  med radius 2 beveger seg langs en rett linje. Ved tidspunktet  $t$  vil sentrum i  $K_1$  ha koordinatene  $(2t, 1, 3)$ .

a) Bestem en likning for  $K_1$  uttrykt ved  $t$ .

b) Ved hvilket tidspunkt vil  $K_1$  tangere  $yz$ -planet?

En annen kuleflate  $K_2$  med radius  $r$  er gitt ved likningen

$$K_2: x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

c) Ved hvilket tidspunkt vil de to kuleflatene  $K_1$  og  $K_2$  tangere hverandre dersom  $r = 2$ ?

d) Bestem eksakt den minste verdien til  $r$  som gjør at de to kulene tangerer hverandre.

### Oppgave 3 (4 poeng)

En bedrift slipper ut 20 000 tonn CO<sub>2</sub> i 2018. De har et mål om å redusere de årlige utslippene med 15 % hvert år fra og med 2019.

- a) Hvor mye CO<sub>2</sub> vil bedriften slippe ut til sammen i løpet av de ti årene 2018–2027 dersom de klarer å nå målet?

En annen bedrift slipper ut 30 000 tonn CO<sub>2</sub> i 2018.

- b) Hvor mange prosent må denne bedriften redusere utslippene med per år for at bedriftene til sammen skal slippe ut like mye i løpet av årene 2018–2027?

### Oppgave 4 (8 poeng)

I en tank renner det inn vann med konstant fart. Samtidig renner det ut vann gjennom et hull i bunnen av tanken. Vannmengden som renner ut per minutt, er til enhver tid proporsjonal med vannmengden i tanken. La  $y(t)$  liter være vannmengden i tanken etter  $t$  minutter. Da er  $y$  løsningen av differensiallikningen

$$y' = 3,2 - 0,14y, \quad y(0) = 200$$

- a) Forklar hva tallene 3,2 og 0,14 og 200 står for.
- b) Løs differensiallikningen.
- c) Hvor mye vann er det i tanken etter 20 min?

I en annen tank renner det inn 1,5 L vann per minutt. Også i denne tanken renner det ut vann gjennom et hull i bunnen. Vannmengden som renner ut, er proporsjonal med vannmengden i tanken. Når  $t = 0$ , er det 0 L i denne tanken. Etter lang tid vil vannmengden i tanken stabilisere seg på 10 L.

- d) Hvor mye vann er det i denne tanken etter 20 min?